

## Caracteres Diagnósticos de Campo de Algunos Líquenes de San Quintín

*P. Cubas, J. Núñez, A. Crespo y P.K. Divakar*



*Xanthoria parietina*. Talo foliáceo amarillo a anaranjado-amarillento, con lóbulos anchos y apotecios de color naranja. Escala = 1 cm.



*Physcia biziana*. Talo foliáceo blanquecino y pruinoso sin manchas blancas en el talo, totalmente adherido al sustrato. Sin o con apotecios de disco gris oscuro pruinoso. Cara inferior blanca con ricinas escasas y blancas. Escala = 1 cm.




*Physcia aipolia*. Talo foliáceo blanquecino sin pruina y con manchas blancas, totalmente adherido al sustrato. Sin o con apotecios de disco gris oscuro pruinoso o no. Cara inferior blanca con ricinas escasas y blancas. Escala = 1 cm.



*Physcia adscendens*. Lique foliáceo de color gris-blanquecino, de lóbulos estrechos, con cilios y soralios en los extremos convexos de los lóbulos. Escala = 1 cm.




*Parmelina quercina*. Liquen foliáceo con talo gris claro y apotecios marrones con borde gris. Cara inferior oscura con ricinas simples. Escala = 1 cm.



*Parmelina tiliacea*. Liquen foliáceo con talo gris claro y abundantes isidios con el ápice oscuro, normalmente sin apotecios. Cara inferior oscura con ricinas simples. Escala = 1 cm.



*Melanohalea exasperata*. Talo foliáceo parcialmente adherido al sustrato, de color marrón oliváceo con isidios verruciformes planos en el ápice el cual presenta una mancha clara. Apotecios del color del talo y con borde isidiado. Cara inferior oscura con ricinas simples. Escala = 1 cm.



*Lecanora carpinea*. Talo crustáceo gris, bastante liso, casi cubierto de apotecios muy pruinosos deformados por compresión mutua. Escala = 1 cm.



*Lecanora muralis*. Talo crustáceo, lobulado, gris a parduzco, con superficie rugosa, formando roseta regular. Apotecios cárneos o parduzcos. Escala = 1 cm.

[Volver al Documento Principal](#)